

Ваш малыш может появиться на свет с инфекционным поражением глаз, так называемым трихомонадным конъюнктивитом. Можно вылечить трихомониаз во время беременности, не причинив вреда ребенку.



## **ВЫ И ВАШ ПАРТНЕР**

**ЕСЛИ ВЫ БОЛЬНЫ ТРИХОМОНИАЗОМ, ВАМ СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ СВОЕМУ ПОЛОВОМУ ПАРТНЕРУ. ДАЖЕ ЕСЛИ У ПАРНЕРА НЕТ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ,**

**ПОПРОСИТЕ ЕГО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ, ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ.**

**ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ПРЕЗЕРВАТИВОМ. ВЫ МОЖЕТЕ ВСТУПАТЬ В ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА КОНТРОЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОКАЖЕТ, ЧТО У ВАС И ВАШЕГО ПАРТНЕРА «ВСЕ В ПОРЯДКЕ»**

Разработала: м/с Ю.А. Вахрушева

ГАУЗ «Городская поликлиника №4»

# **ТРИХОМОНИАЗ**



г. Чита 2015

## ТРИХОМОНИАЗ

относится к инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП). Вызывается бактериями и может поражать влагалище, шейку матки, мочеиспускательный канал (уретру), редко прямую кишку, миндалины, конъюнктиву. Крайне редко возможно бытовое заражение через предметы туалета, белье. Возможно, заражение новорожденных в процессе родов от больной матери.

## КАК МОЖНО УЗНАТЬ

О

## ЗАРАЖЕНИИ ТРИХОМОНИАЗОМ?



Вы можете и не узнать о заражении – в этом коварное свойство трихомониаза. Каких – либо специфических проявлений болезни не существует. Иногда другие ИППП могут маскировать симптомы трихомониаза.

## ЖЕНЩИНЫ

в некоторых случаях могут заметить:



✓ Необычные изменения влагалищных выделений, которые могут стать обильными, водянистыми, желтыми или зеленоватыми

✓ Боль или чувство дискомфорта при мочеиспускании

## МУЖЧИНЫ

могут

заметить:



✓ Белые или желтые выделения из уретры. Иногда их бывает достаточно, чтобы запачкать белье

✓ Боль или чувство дискомфорта при мочеиспускании

Если возникло подозрение, что Вы могли заразиться трихомониазом, Вам следует обратиться к врачу. Перед посещением врача не мойтесь, воздержитесь от мочеиспускания в течение трех часов.



## ЛЕЧЕНИЕ ИМЕЕТ

## ОЧЕНЬ, ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Не леченый трихомониаз может вызвать воспалительные заболевания органов малого таза у женщин. При этом может



ухудшиться общее состояние, повыситься температура, могут возникнуть боли внизу живота и в спине, неприятные ощущения при половых контактах. Воспалительные заболевания могут затруднять зачатие и даже приводить к развитию бесплодия.