

энтеробиоз

Острицы-черви белого цвета, веретенообразной формы, размер от 0,3 до 10 мм



Симптомы:

- Основной симптом - зуд промежности и кожи вокруг анального отверстия
- Расстройство аппетита
- Раздражительность
- Тошнота, рвота, диарея
- Боль в животе
- Покраснение кожи вокруг ануса

Осложнения:

- У женщин при проникновении во влагалище могут приводить к эндометриту и вульвавагиниту
- При продолжительных инвазиях в отсутствие лечения приводят к интоксикации, истощению, быстрой утомляемости, аллергии
- При частом расчесывании - образование микротравм и их инфицирование

энтеробиоз

Острицы-черви белого цвета, веретенообразной формы, размер от 0,3 до 10 мм



Симптомы:

- Основной симптом - зуд промежности и кожи вокруг анального отверстия
- Расстройство аппетита
- Раздражительность
- Тошнота, рвота, диарея
- Боль в животе
- Покраснение кожи вокруг ануса

Осложнения:

- У женщин при проникновении во влагалище могут приводить к эндометриту и вульвавагиниту
- При продолжительных инвазиях в отсутствие лечения приводят к интоксикации, истощению, быстрой утомляемости, аллергии
- При частом расчесывании - образование микротравм и их инфицирование

Диагностика:

- Соскоб липкой лентой на выявление яиц остриц



Подготовка к сдаче анализа на

энтеробиоз: • Желательно утром, послесна, додефекации

- Без предварительных гигиенических процедур (подмывания)

Профилактика повторного заражения:

- При инфицировании рекомендуется спать в трусах, резинка которых плотно облегает бедра
- При выявлении энтеробиоза у одного члена семьи лечение назначается всем членам семьи, независимо от наличия у них гельминтоза.



- Соблюдение гигиенических процедур (мытьё рук, подмывание дважды в день, ежедневная смена белья с обязательным его проутюживанием)



- Ежедневные влажные уборки квартиры
- Повторная сдача анализов после лечения (3 раза).

(Разработала материал Ковалева Анна Юрьевна)

Диагностика:

- Соскоб липкой лентой на выявление яиц остриц



Подготовка к сдаче анализа на

энтеробиоз: • Желательно утром, послесна, додефекации

- Без предварительных гигиенических процедур (подмывания)

Профилактика повторного заражения:

- При инфицировании рекомендуется спать в трусах, резинка которых плотно облегает бедра
- При выявлении энтеробиоза у одного члена семьи лечение назначается всем членам семьи, независимо от наличия у них гельминтоза.



- Соблюдение гигиенических процедур (мытьё рук, подмывание дважды в день, ежедневная смена белья с обязательным его проутюживанием)



- Ежедневные влажные уборки квартиры
- Повторная сдача анализов после лечения (3 раза).

(Разработала материал Ковалева Анна Юрьевна)

