

Обследованию на ВПЧ подлежат:

- лица с большим количеством половых партнеров
- лица, имеющие хронические генитальные инфекции
- женщины с любыми образованиями на шейке матки, с любыми образованиями на вульве
- лица с кондиломатозными образованиями.

Течение ВПЧ – инфекции зависит от состояния иммунной системы и может быть с клиническими проявлениями и без них, поэтому часто проявление ВПЧ- инфекции бывают врачебной находкой во время профилактического осмотра.



Раннее лечение минимальных изменений на шейке матки позволяет предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания и развитие рака шейки матки!!!

Разработала: Врач – гинеколог Л.Ю. Низелькаева

ГАУЗ «Городская поликлиника №4»

Вирусная Папиллома Человека



г. Чита 2015

Папилломавирусная инфекция - является самой распространенной инфекцией в Европе и значимой проблемой здравоохранения. Около 20 миллионов



человек в настоящее время инфицированы вирусом папилломы человека (ВПЧ). Половина сексуально активных мужчин и женщин инфицируются ВПЧ в какой-то момент своей жизни. Более 80% женщин

заражаются ВПЧ уже через 2 года после начала половой жизни.

Доказанными факторами риска инфицирования ВПЧ являются:

- раннее начало половой жизни
- наличие более 3-х половых партнеров
- курение
- наличие других инфекций, передающихся половым путем



- нарушение иммунитета
- факторы окружающей среды



- условия жизни и работы

Передача ВПЧ происходит при непосредственном контакте кожных покровов и слизистых оболочек, преимущественно при половом контакте (в том числе и нетрадиционном), при наличие микротрещин и во время родов.

Вирус поражает только эпителий, в крови его нет.

Поражение клеток вирусом приводит к их активному делению, что приводит к появлению папиллом на слизистых (шейки, гортани и других местах). Длительное воздействие вируса на эпителий приводит к изменению функции и строения клеток, появляются «больные» клетки вплоть до раковых.

